



Università
Ca' Foscari
Venezia

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE
DI CHIMICO – SEZIONE B
I Sessione 2016

PRIMA PROVA

Traccia 2

- 1) Il legame chimico
- 2) Il ruolo del chimico nel mondo contemporaneo

SECONDA PROVA

Traccia 1

- 1) Polimeri naturali e sintetici
- 2) Tecniche di analisi cromatografiche: GC, GC-MS



Università
Ca' Foscari
Venezia

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE
DI CHIMICO – SEZIONE B
I Sessione 2016

PROVA PRATICA

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ACIDO ACETICO NELL'ACETO COMMERCIALE.

Materiali

- Aceto commerciale (acidità circa 6%)
- Soluzione di NaOH ($M = 0.1 \text{ mol/L}$)
- Indicatore a scelta del candidato: fenolftaleina (viraggio, pH 8 - 10), arancio metile (viraggio, pH 3 - 5), blu di bromotimolo (viraggio, pH 6 - 8)
- Acqua distillata
- Sostegno per buretta
- Buretta graduata (portata 50 mL sensibilità 0.1 mL)
- Matraccio tarato (con capacità 100 mL)
- Pallone di Peleo (propipetta)
- Cilindro graduato (portata 50 mL sensibilità 1 mL)
- Beuta da 100 mL
- Becker da 100 mL
- Pipetta tarata da 10 mL
- Pipetta tarata da 20 mL

Densità dell'aceto a temperatura ambiente: 1060 g/mL

Procedimento

Si prepara una soluzione diluendo 10 mL di aceto fino a 100 mL con acqua in un matraccio da 100 mL. Si lava accuratamente la buretta con acqua distillata, si avvina con la soluzione titolante NaOH e si porta a volume. Si introducono in una beuta pulita 20 mL della soluzione diluita di aceto e si aggiungono tre gocce di indicatore; si può diluire con alcuni mL di acqua distillata. Si consiglia di eseguire almeno tre titolazioni annotando il volume di NaOH utilizzato. I risultati finali devono essere espressi in % (massa/massa).

Il candidato dovrà presentare anche una breve relazione scientifica dove vengono riportati i valori delle singole prove ed il valore medio ottenuto.